

采购包 4：病毒及病媒生物 PCR 类

一、服务技术要求

序号	试剂耗材名称		单位	采购控制单价 (元)	是否挂网 产品	参数要求
1	疟疾	疟原虫通用核酸检测试剂	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于粪便、肛拭子、血液等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃ 保存, 有效期不低于 9 个月。
2	疟疾	卵形疟原虫 Curtis/Wallikeri 亚型核酸检测试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于粪便、肛拭子、血液等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃ 保存, 有效期不低于 9 个月。
3	疟疾	三日疟原虫/间日疟原虫/卵形疟原虫/恶性疟原虫核酸检测试剂盒	人份	240	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于粪便、肛拭子、血液等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃ 保存, 有效期不低于 9 个月。
4		流感新冠四重检测试剂	人份	240	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于咽拭子、鼻咽拭子、粪便、肛拭子、血液等样本。用于检测甲型流感通用、乙型流感通用、新冠 ORF1ab 基因、新冠 N 基因四个项目。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃ 保存, 有效期不低于 9 个月。



5	呼吸道病毒	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒	人份	120	是	<p>1、规格：24 反应/盒或 48 反应/盒；PCR-荧光探针法，一步法 RT-PCR ， 分别针对甲型流感病毒和乙型流感病毒设计引物探针。阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取；阳性质控品为含目的片段的重组质粒不需要提取。</p> <p>★2、不用配置反应体系，直接加核酸，加 18 微升核酸。</p> <p>★3、PCR 扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 10 分钟，1 个循环；95℃ 2 分钟，1 个循环；95℃ 10 秒→55℃ 30 秒（收集荧光），40 个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。</p> <p>★4、适用仪器包括 ABI7500、ABI7300、LightCycler480 等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>★5、灵敏度不低于 1.0×10²copies /ml。</p> <p>★6、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>★7、常温保存，稳定性好，效期不低于 12 个月。</p>
6		甲型 H1N1 亚型/季节性 H3 亚型人类流感病毒核酸检测试剂盒	人份	120	否	<p>★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪</p> <p>2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒</p>
7		H3N2 亚型流感病毒核酸检测试剂盒	人份	120	否	<p>★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪</p> <p>2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒</p>
8		N4 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	<p>★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪</p> <p>2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒</p>
9		N5 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	<p>★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪</p> <p>2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒</p>



10		N7 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
11		H11 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
12		H12 亚型流感病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
13		H13 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
14		H2 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
15		H4 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
16		H6 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
17		H8 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
18		H14 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒



19	呼吸道病毒	H15 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
20		H16 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
21		H17 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
22		H18 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
23		N10 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
24		N11 亚型流感病毒核酸试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
25		Yamagata 系/Victoria 系乙型流感病毒核酸试剂盒	人份	120	否	1、规格：24 反应/盒或 48 反应/盒；PCR-荧光探针法，一步法 RT-PCR，分别针对 Yamagata 和 Victoria 型设计引物探针。阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取；阳性质控品为含目的片段的重组质粒不需要提取。 ★2、不用配置反应体系，直接加核酸，加 18 微升核酸。 ★3、PCR 扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 10 分钟，1 个循环；95℃ 2 分钟，1 个循环；95℃ 10 秒→55℃ 30 秒（收集荧光），40 个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。 ★4、适用仪器包括 ABI7500、ABI7300、LightCycler480 等荧



						光定量 PCR 仪。 ★5、灵敏度不低于 1.0×10^2 copies /ml。 ★6、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 ★7、常温保存，稳定性好，效期不低于 12 个月。
26		H7N9 亚型禽流感病毒核酸试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
27		H5N6 亚型禽流感病毒核酸测试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
28		H5N1 亚型禽流感病毒核酸试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
29		H9N2 亚型禽流感病毒核酸检测试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
30		H10N8 亚型禽流感病毒核酸检测试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
31		H5N8 亚型禽流感病毒核酸检测试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
32		H7N2 亚型禽流感病毒核酸检测试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
33		H3N8 亚型禽流感病毒核酸检测试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪



						2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
34		H7N4 亚型禽流感病毒核酸检测试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
35	肠道病毒	柯萨奇病毒 A16、肠道病毒 71、肠道病毒三重核酸检测试剂	人份	180	是	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于环境样本、呕吐物、咽拭子、鼻咽拭子、粪便、肛拭子、血液等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃ 保存, 有效期不低于 9 个月。
36		柯萨奇病毒 A2 检测试剂	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
37		柯萨奇病毒 A5 检测试剂	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
38		柯萨奇病毒 A4 型核酸检测试剂盒	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
39		柯萨奇病毒 A4 型/A6 型/A10 型核酸检测试剂盒	人份	180	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
40		柯萨奇病毒 A6 型/A10 型核酸检测试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
41		柯萨奇病毒 A8 检测试剂	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒



42		柯萨奇病毒 B1 型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	人份	80	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
43		柯萨奇病毒 B2 型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	人份	80	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
44		柯萨奇病毒 B3 型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	人份	80	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
45		柯萨奇病毒 B5 型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	人份	80	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
46		腹泻病毒多重核酸检测试剂	人份	400	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
47		肠道腺病毒 40 型/41 型核酸检测试剂盒	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
48		A 组轮状病毒/诺如病毒 GI/诺如病毒 GII 核酸检测试剂盒	人份	180	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
49		A/B/C 轮状病毒核酸检测试剂	人份	180	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、该试剂品牌可提供同流感病毒通用及各种亚型检测分装盒
50	麻疹、风疹	麻/风疹双重核酸检测试剂	人份	120	是	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。用于检测麻疹、风疹病毒核酸。与感染部位相同或

						感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃保存,有效期不低于9个月。
51	多病原 核酸检测	27 重多病原检测试剂	人份	1700	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法: PCR 实时荧光法。适用于痰液、咽拭子、鼻咽拭子等样本。用于呼吸道病毒、肠道病毒、细菌等多项病原学核酸检测。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃保存,有效期不低于9个月。
52	耗材	8 联管	个	8	否	★1、适用于罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪。 2、耐高温、不易变形
53		无酶 EP 管	0.5mL/个	1.5	否	用于 PCR 试剂体系配制。
54		2ML 螺旋管	个	2	否	用于检测样本分装、保存。无酶。可长期存放到超低温冰箱中
55		粪便处理试剂 TRIzol	瓶	1500	否	用于新冠核酸检测样本灭活前处理
56		痰处理液	瓶	240	否	规格: 50ml*4。适用于新冠等核酸检测痰液样本前处理
57	呼吸道合 胞病	呼吸道合胞病毒核酸检测试剂	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法: PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃保存,有效期不低于9个月。
58	副流感病 毒	副流感病毒核酸检测试剂	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法: PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃保存,有效期不低于9个月。



59	人冠状病毒	人冠状病毒核酸检测试剂	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃ 保存, 有效期不低于 9 个月。
60		人冠状病毒 HCoV-229E 核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃ 保存, 有效期不低于 9 个月。
61		人冠状病毒 HCoV-NL63 核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃ 保存, 有效期不低于 9 个月。
62		人冠状病毒 HCoV-OC43 核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃ 保存, 有效期不低于 9 个月。
63		人冠状病毒 HCoV-HKU1 核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃ 保存, 有效期不低于 9 个月。
64	猪流感	EA H1N1 核酸检测试剂盒（欧亚猪流感核酸检测试剂）	人份	120	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭

						子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃保存,有效期不低于9个月。
65	非典型肺炎冠状病毒	非典型肺炎冠状病毒核酸检测试剂(SARS)	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法: PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃保存,有效期不低于9个月。
66	肠道腺病毒	肠道腺病毒核酸检测试剂	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法: PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃保存,有效期不低于9个月。
67	多病原 核酸检测 冠状病毒	其他不常见疾病检测试剂	人份	60	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法: PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃保存,有效期不低于9个月。
68		中东呼吸综合征冠状病毒核酸检测试剂盒	人份	80	否	★1、匹配罗式 LightCycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 等 PCR 扩增仪 2、方法: PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。-20±5℃保存,有效期不低于9个月。
69	流感	流感病毒抗原检测试剂	人份	28	是	方法: 胶体金法, 用于流感病毒快速检测。适合咽拭子、血清、血浆、全血样本。保质期不低于9个月。
70	疟疾	疟原虫快速检测试剂	人份	24	是	方法: 胶体金法, 用于疟原虫快速检测。适合血清、血浆、全血样本。保质期不低于9个月。
71	新冠	新冠抗体检测试剂	人份	14	否	方法: 胶体金法, 用于新冠总抗体、中和抗体、IgM、IgG 等抗体筛查。适合血清、血浆、全血样本。保质期不低于9个月。



72		新冠病毒抗原检测试剂盒(胶体金)	盒	78	是	适用于口咽/鼻咽拭子样本。无需额外仪器辅助
73	通用耗材	手提医疗废物垃圾袋(黄色加厚)	个	1	否	乙烯 HDPE 材质(新料)。采用恒温技术封底制袋。适用于医院单位废弃物一次性器械和感染性垃圾的垃圾包装袋
74		N95 口罩 9132	个	25	否	1、采用无纺布原料(内、外层)和 N95 过滤布(夹层)热合而成,供医疗工作环境下,过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等; ★2、符合 GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》
75		N95 口罩 1860	个	25	否	1、采用无纺布原料(内、外层)和 N95 过滤布(夹层)热合而成,供医疗工作环境下,过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等; ★2、符合 GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》
76		一次性医用防护服	个	75	否	★1、符合 GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》; 2、采用 PP+PE 医用抗菌无孔透气材料;适用临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。
77		一次性手术隔离衣	个	25	否	面料应能阻止轻微液体的渗透,袖口应为弹性收口;独立包装 高效吸附,抗菌抗病毒性能优异,柔软舒适;高效吸附,抗菌抗病毒性能优异,柔软舒适;灭菌处理,独立包装。
78		一次性脚套	个	4	否	简易型鞋套,蓝色,无纺布材质,防尘、防水、透气、抗静电。
79		一次性防护面屏	个	5	否	由高分子材料制成,泡沫条和固定装置组成,一次性使用,对体液,血液分拣起到防护作用,有防雾功能。
80		一次性医用外科口罩	个	1	否	符合 YY0469-2011 标准要求;独立包装,有效期不低于 2 年。
81		一次性医用外科手套	付	3	否	天然橡胶胶乳制成,手指向手掌面弯曲的手套,麻面,无粉;独立包装
82		一次性医用防护帽	只	0.5	否	无纺布 30 克/平方米以上;采用无纺织物制造



83	通用 耗材	防雾喷剂	瓶	25	否	在玻璃表面形成保护膜，有效隔离水雾阻止雾气形成，同时具备清洁污垢的效果；主要成分：表面活性剂、水等。
84		10uL 无菌带滤芯枪头	盒	60	否	96 支/盒
85		200uL 无菌带滤芯枪头	盒	60	否	96 支/盒
86		1000uL 无菌带滤芯枪头	盒	60	否	96 支/盒
87		10uL 无菌不带滤芯枪头	盒	40	否	96 支/盒
88		200uL 无菌不带滤芯枪头	盒	40	否	96 支/盒
89		1000uL 无菌不带滤芯枪头	盒	40	否	96 支/盒
90		一次性橡胶手套（小号）盒	盒	160	否	50 双/盒 麻面、无粉，非单独包装
91		一次性橡胶手套（中号）盒	盒	160	否	50 双/盒 麻面、无粉，非单独包装
92		一次性橡胶手套（大号）盒	盒	160	否	50 双/盒 麻面、无粉，非单独包装
93		一次性使用病毒采样管	盒	150	否	单采，非灭活型
94		定性滤纸	盒	30	否	100 张/盒
95	细胞培养	青链霉素母液	瓶	200	否	规格：100ml/瓶。试剂成品 符合流感细胞培养浓度要求
96		DMEM 培养液	瓶	200	否	规格：500ml/瓶。试剂成品 符合流感细胞培养浓度要求
97		PBS 缓冲液	瓶	200	否	规格：500ml/瓶。试剂成品 符合流感细胞培养浓度要求
98		Hank' S 液	瓶	200	否	规格：500ml/瓶。试剂成品 符合流感细胞培养浓度要求
99		7.5%牛血清白蛋白组分 V	瓶	500	否	规格：100ml/瓶。试剂成品 符合流感细胞培养浓度要求
100		HEPES 缓冲液	瓶	1500	否	规格：100ml/瓶。试剂成品 符合流感细胞培养浓度要求
101		胎牛血清	瓶	800	否	规格：100ml/瓶。试剂成品 符合流感细胞培养浓度要求



102	耗材	0.5%EDTA-胰酶	瓶	700	否	规格：100ml/瓶。试剂成品 符合流感细胞培养浓度要求
103		TPCK 胰酶	瓶	800	否	规格：50mg/瓶。试剂成品 符合流感细胞培养浓度要求
104		ABO 血型鉴定试剂	盒	800	是	规格：40t/瓶。试剂成品 符合流感细胞培养浓度要求
105		T25 细胞培养瓶	个	6	否	透明、一次性成品。符合 MDCK 细胞培养材质要求
106		T75 细胞培养瓶	个	10	否	透明、一次性成品。符合 MDCK 细胞培养材质要求
107		5ML 注射器	个	1	否	一次性成品
108		2ML 注射器	个	0.5	否	一次性成品
109		U 型板	个	8	否	用于流感病毒血凝抑制滴度检测
110		50ML 离心管	个	2	否	一次性无菌塑料成品
111		15ML 离心管	个	1.5	否	一次性无菌塑料成品
112		10ML 带滤芯吸管	个	2.5	否	一次性无菌塑料成品
113		1.0ML 带滤芯吸管	个	1.5	否	一次性无菌塑料成品
114		0.02UM 针头过滤器	个	8.5	否	过滤流感病毒分离培养液，无菌塑料
115		凹槽	个	8	否	一次性无菌塑料成品
116		待种毒 susMDCK 细胞培养管/低密度（XB-BJ-007L）	管	200	否	用于流感病毒等病原学分离
117		SPF EGGS（无菌鸡胚）	个	30	否	用于流感病毒等病原学分离
118	病媒老鼠、蚊子细菌病毒检测试剂	乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycle480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、方法：PCR 实时荧光法。适用于环境样本、咽拭子、鼻咽拭子等样本。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交

						叉反应。-20±5℃保存,有效期不低于9个月。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。
119		西尼罗河病毒核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
120		基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
121		登革病毒通用型核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
122		登革病毒 I 型核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
123		登革病毒 II 型核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
124		登革病毒 III 型核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。



125		登革病毒IV型核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
126		黄热病病毒核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
127		寨卡、登革和基孔肯雅病毒核酸 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	180	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
128		钩端螺旋体核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
129		莫氏立克次体核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
130		恙虫病立克次体核酸检测试剂 盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
131		土拉弗朗西斯菌检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。

						-20±5℃保存,有效期不低于9个月。
132		鼠疫耶尔森氏菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
133		鼠疫耶尔森菌 pla/cfaI 基因双通道核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	人份	120	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
134		鼠疫耶尔森菌 pla/cfaI/chro392 基因三通道核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	人份	180	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
135		肾综合征汉滩病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	人份	60	否	★1、适用于西安天隆 Gentier96 罗氏 Light Cycley480 宏石 SLAN-96P 博日 FQD-96A 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 -20±5℃保存,有效期不低于9个月。
136	病媒实验 耗材	冰盒	盒	10	否	用于蚊子等病媒样本暂存
137		移液器放置架	个	40	否	生物安全柜放置移液枪
138		PCR 管架	个	10	否	放置 EP 管架子
139		棉球	个	50	否	解剖医用消毒
140		样本放置板架	个	200	否	用于放置组织破碎时平底管

二、综合评分明细表

序号	评分因素	分值	评分标准	备注
1	报价	30分	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价÷磋商报价)×30%×100。	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本磋商文件供应商须知前附表规定执行。
2	技术指标和配置	35分	<p>完全满足磋商文件第五章“服务技术要求”的得35分；供应商有不满足的，则在此基础上，按以下原则扣分：每有一条不满足磋商文件第五章“服务技术要求”条款要求的，一条扣0.25分，扣完为止。</p> <p>注：“服务技术要求”中按序号1、2…计算参数条数，共计140条。★号作为实质性要求，不参与评分。</p>	
3	项目配送方案	21分	<p>根据供应商针对本项目的配送方案相关内容进行综合评分，项目配送方案包含①配送服务计划；②备货方案；③配送运输服务队伍及人员安排方案；④配送进度安排及保障措施；⑤项目服务质量保障措施；⑥安全保障措施；⑦缺货时的配送应急措施。每有一条内容完善且与本项目匹配的得3分；每有一条内容存在缺陷的得1.5分；每有一条内容缺失得0分；本项最多得21分；</p> <p>注：内容完善且与本项目匹配是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：所适用的技术标准及技术规范不符合本项目要求或不适用项目特征的情形或内容不完整或分析内容与实际情况不符或前后不一致或不可能实现的夸大情形。</p>	



4	服务方案	8分	<p>根据供应商针对本项目的服务方案相关内容进行综合评分，服务方案包含①公司内部管理制度；②特殊试剂（耗材）服务保证措施；③恶劣天气对产品存储办法；④遇突发公共卫生事件处理情况。每有一条内容完善且与本项目匹配的得2分；每有一条内容存在缺陷的得1分；每有一条内容缺失得0分；本项最多得8分；</p> <p>注：内容完善且与本项目匹配是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际、符合行业政策、满足本项目要求；内容存在缺陷是指：所适用的技术标准及技术规范不符合本项目要求或不适用项目特征的情形或内容不完整或分析内容与实际情况不符或前后不一致或不可能实现的夸大情形。</p>	
5	业绩	6分	<p>供应商提供2019年1月1日至递交响应文件截止时间的类似本项目的业绩，每有一个得0.5分，最多得6分。（提供合同复印件加盖供应商公章（鲜章））</p>	